

Дачная

БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ
ОТ ЛИДЕРОВ СЕЛЬХОЗИНДУСТРИИ

АГРОМЕРА

№ 7⁽⁴⁶⁾



ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ СТР. 22-23

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Опубликуй фотографию с продукцией МЕРА и жди
приз на **30 000 рублей** от магазина в котором купил!



Условия на сайте www.mera1.ru



**ДАЧНАЯ АГРОМЕРА ПРОДАЕТСЯ В КИОСКАХ МК В ВОЛГОГРАДЕ И ВСЕ ДЛЯ ВАС,
А ТАКЖЕ СЕТИ МАГАЗИНОВ "ПОКУПОЧКА"**

ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДА И ОБЛАСТИ МОГУТ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ ПО ИНДЕКСАМ:
П9966 И ПР006

ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ



Дача. Сад. Огород. Усадьба.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ

КАПУСТА НЕ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ В ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩ. ПРОБЛЕМ С НЕЙ БЫВАЕТ МНОГО: ТО КОРЕНЬ СГНИЕТ, ТО ГУСЕНИЦЫ ИЛИ СЛИЗНИ ПОЕДЯТ, ТО ЛИСТЬЯ ПОЖЕЛТЕЮТ. ОДНАКО И АБСОЛЮТНО ЗДОРОВАЯ РАССАДА МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ДАЧНИКА ЗАПАНИКОВАТЬ. ПРИЧИНА – ОТСУТСТВИЕ КОЧАНОВ.

КРАСНА ИЗБА ПИРОГАМИ, А КАПУСТА – КОЧАНАМИ. ЧТОБЫ СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ КАПУСТЫ, НАДО НЕМАЛО ПОТРУДИТЬСЯ. ОДНАКО РЕЗУЛЬТАТ ТОГО СТОИТ.



ПОЧЕМУ У КАПУСТЫ НЕ ЗАВЯЗЫВАЮТСЯ КОЧАНЫ?

Спровоцировать отсутствие завязей могут многие причины. В одних случаях "виновата" погода, в других – условия выращивания, в третьих – наши ошибки. Если вы хотите помочь своей капусте, обратите внимание на основные факторы, влияющие на завязывание кочанов.

Причина 1 – плохие семена

Что значит плохие? Во-первых, это просто некачественный материал. Капуста, оставленная на семена, переопылилась с другим растением из семейства Крестоцветные, и полученный гибрид в принципе не может образовывать кочаны. А вы, не догадываясь об этом, приобрели пакетик семян, поверив написанному на упаковке. Доверяйте только проверенным компаниям!

Во-вторых, семена могут быть очень хорошими, но они предназначены для выращивания в другой климатической зоне. Ваши условия им просто не подходят.

Причина 2 – неправильное место

Капуста – культура светолюбивая. Для завязывания кочанов ей нужно место, где будет солнечно в течение всего дня. Все высокорос-

лые культуры, дающие тень, нужно сажать подальше от капустной грядки. В противном случае капуста будет растрчивать свои силы на то, чтобы расти вверх, а вот кочаны завязываться не будут.

Причина 3 – кислая почва

Капуста предпочитает почвы с нейтральной кислотностью. Если же pH вашей почвы ниже, чем 6, 5, то капусте это вряд ли понравится. Чтобы повысить уровень pH, проведите известкование: внесите в почву доломитовую муку, древесную золу и т.п.

Причина 4 – неподходящие предшественники

Если перед капустой на грядке росли ее собратья по семейству – крестоцветные, то шансы увидеть кочаны резко падают. Не дружит капуста также и с тыквой. А вот бобовые, пасленовые или лук влияют на формирование кочанов капусты благоприятно.

Важно! Капусту можно возвращать на ту же грядку не раньше, чем через 3 года.

Причина 5 – посадка с ошибками

При посадке капусты важно обращать внимание на следующие моменты:

Время посадки. Ранние сорта капусты надо высаживать в открытый грунт с конца апреля до середины мая, средние – с конца апреля и до начала июня, поздние – с 10 по 30 мая.

Схема посадки. При посадке обязательно учитывайте расстояние между рассадой. Для ранней капусты расстояние между рядами – 50 см, для поздних и средних сортов необходимо уже не меньше 70 см.

Причина 6 – температурный режим

Капуста не любитель высокой температуры. Наиболее комфортно она себя чувствует при 17-20°C. В жаркую погоду формирование кочанов приостанавливается. Не происходит развития завязей и при низких температурах.

На заметку! Чтобы защитить кочаны капусты от сильной жары, свяжите листья над кочаном, спрятав его в "бутон". Будьте осторожны, чтобы не обломать их.

Причина 7 – отсутствие подкормок

Как и любому растению, капусте нужно дополнительное питание с микроэлементами. Чем же подкормить капусту для формирования кочанов? В конце июня – начале июля можно внести под корень по 1 л раствора азофоски (в 10 л воды развести 1 спичечный коробок удобрения) или суперфосфата (20 г на ведро воды).

Причина 8 – неправильный уход

Что включает в себя уход за капустой?

Во-первых, полив. Растение с такими большими листьями испаряет ежедневно много воды. Следовательно, эту потерю нужно постоянно восполнять. Особенно это актуально в жаркие дни. Воды под каждый куст нужно лить столько, чтобы почва промокала примерно на 30-40 см. Это стимулирует завязывание кочанов капусты.

НА КАПУСТЕ И КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ?

Важно! За месяц-полтора до сбора урожая полив необходимо уменьшить.

Во-вторых, рыхление. Из-за частых поливов почва вокруг кустов капусты уплотняется, появляется корка. Это препятствует насыщению почвы воздухом, и капуста перестает расти. Чтобы доставить воздух к корням, почву нужно постоянно рыхлить.

В-третьих, мульча. В жару грядку капусты лучше замульчировать. Это поможет избежать быстрого испарения влаги и чрезмерного перегрева почвы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НА КАПУСТЕ ЗАВЯЗЫВАЛИСЬ КОЧАНЫ?

Чтобы у капусты активнее формировались кочаны, помочь ей можно различными народными способами.

ДРОЖЖЕВАЯ ПОДКОРМКА КАПУСТЫ

Возьмите 100 г дрожжей и 0,5 л варенья. Все это разведите в ве-



дре воды и поставьте в теплое место для брожения. Перед поливом этим средством всю грядку с капустой хорошо увлажните водой, нагретой в течение дня на солнце. Затем разведите 1 стакан получившейся после брожения смеси в 10 л воды. Этим раствором полейте капусту под корень – 1 л на куст. Пользоваться подобным средством можно не чаще, чем раз в три недели.

ПОДКОРМКА КАПУСТЫ НАВОЗОМ И ЗОЛОЙ

Когда на растении появится девятый лист, можно сделать такую подкормку. В ведре воды разведите 0,5 л свежей навозной жижи и 40 г древесной золы. Оставьте на несколько

дней, чтобы из раствора выветрился лишний аммиак. Перед подкормкой, как и в предыдущем случае, вначале обильно полейте грядку. Затем под каждый куст вылейте по 1 стакану раствора. В середине лета повторите подкормку еще раз.

БОРНАЯ КИСЛОТА ДЛЯ КАПУСТЫ

А теперь рецепт внекорневой подкормки, которая очень хорошо влияет на появление кочанов на капусте.

В 1 л горячей воды разведите 2 г борной кислоты. Добавьте к получившемуся раствору 9 л холодной воды. Этим составом опрыскивайте растения в сухую погоду. Через 7 дней проведите еще одну внекорневую подкормку – на этот раз препаратом Завязь (разведите по инструкции).

Как видите, вы можете помочь своей капусте и повлиять на завязывание кочанов. За это она отблагодарит вас, и вы всю зиму будете баловать себя хрустящими соленьями.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

26-29 сентября

ВЕДУЩЕЕ СОБЫТИЕ ВО ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА!

Готовим сад к будущему урожаю!
Новый ассортимент растений!

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- БОЛЕЕ 1 000 ВИДОВ РАСТЕНИЙ И САЖЕНЦЕВ ИЗ ВЕДУЩИХ ПИТОМНИКОВ
- УДОБРЕНИЯ И ПОДКОРМКИ ДЛЯ БОГАТОГО УРОЖАЯ
- САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
- БАНИ И САУНЫ

Тел. (863) 268-77-95; www.donexpocentre.ru

Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 30

КАК ВЫРАСТИТЬ РЕДИС ЛЕТОМ – ПОПГОДА НЕПРЕРЫВНОГО УРОЖАЯ

РЕДИС – КУЛЬТУРА КОРОТКОГО СВЕТОВОГО ДНЯ, К ТОМУ ЖЕ ПРЕДПОЧИТАЮЩАЯ ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ И ОБИЛИЕ ВОДЫ. ВЕСНА И ОСЕНЬ ДЛЯ НЕГО – ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. НО, ПРИЛОЖИВ НЕМНОГО УСИЛИЙ, МОЖНО ПОСЕЛИТЬ ЭТУ КУЛЬТУРУ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ НА ЦЕЛОЕ ЛЕТО.

На самом деле редис не капризен, но с непривычки можно и не получить желаемого урожая. Достаточно знать всего несколько секретов выращивания редиски летом, и ее хрустящие острые корнеплоды всегда будут на вашем столе.

ВЫБИРАЙТЕ СОРТА ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Не все сорта редиса пригодны для выращивания на протяжении всего лета. Многие из них склонны к стрелкованию, а значит, в разгар сезона больше половины ваших посадок может уйти "в цвет".

Сейчас на семенах можно встретить пометку "подходит для непрерывного выращивания" – ориентируйтесь на нее. Если такой пометки нет, подойдет и информация о том, что сорт не склонен к цветущности. Наиболее популярными для выращивания летом являются сорта и гибриды – **Вюрцбургский 59, Глориет F1, Дабел F1, Гусар, Джоли, Дуро, Рамтоуш**, но вы можете смело экспериментировать со своими любимчиками.

СЕЙТЕ НА РАССТОЯНИИ

Еще одной причиной стрелкования редиса становится загущенный посев. Конечно, гораздо проще "посолить" почву семенами, неравномерно распределяя их, но результат будет нерадужным. Если вы не готовы распределять семена по гряде равномерно (3-4 см между растениями в ряду, 10 см между рядами) из-за того, что они очень мелкие, попробуйте сеять дражированный редис.

Если же вы посеяли редис как обычно, не упустите момент и проредите всходы, как только на растениях появится первая пара настоящих листьев.

ВЫРАЩИВАЙТЕ В ТЕНИ ИЛИ ПРИТЕНЯЙТЕ

Самое важное в выращивании редиса летом – правильное освещение. В идеале растения должны находиться на свету 10-12 часов. Если день затягивается, редис воспринимает это как знак "пора цвести", и урожая можно не ждать.

Что вы можете сделать для решения этой проблемы? Во-первых, отвести посевам самый тенистый уго-



лок на своем участке. А во-вторых, если даже в тени светло большую часть дня, раздобыть дуги и кусок темного укрывного материала (геотекстиля или пленки) и вечерами прятать под ним редиску. Организуйте ей искусственное наступление ночи уже в 17.00-18.00, а открывайте утром не раньше 7.00-8.00. В таком режиме корнеплоды прекрасно завяжутся и нальются.

ЕЖЕДНЕВНО ПОЛИВАЙТЕ

Отсутствие влаги в течение нескольких дней сказывается на редисе крайне пагубно, особенно в паре с высокой температурой. Он не только может застрелковаться, но и грубеет. Сердцевина корнеплода становится рыхлой, и удовольствия от такого овоща вы уже не получите.

Поэтому лучше всего поливать редис ежедневно, утром или вечером, когда прямые лучи солнца не попадают на грядку. Причем обильно, чтобы грунт промокал на 5-7 см.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Ранней весной, когда мы сеем первый редис, многие огородные вредители еще спят или не успели размножиться. А вот в июне-июле они уже разгулялись вовсю и не гнушаются островатым вкусом этого корнеплода. Особенно стараются крестоцветная блошка, капустная муха, совка, гусеницы капустной белянки и проволочник.

Полностью защитить редис от вредителей невозможно, в том числе и потому, что он очень быстро созревает, а значит, применять на нем сильнодействующие средства нельзя. Поэтому придется постоянно вести профилактические обработки – опудривать растения и междурядья золой, табачной пылью, поливать чесночным настоем.



Помощь самой природы!

- Противомикробное, противопаразитное, антисептическое средство.
- Работает против обширной группы вредителей сада и огорода.
- Не вызывает привыкание у насекомых.
- Обладает длительным защитным действием.
- Используют для защиты растений от грибковых заболеваний.
- Применяют для отпугивания змей, мышей, кротов, медведек.



Покупай эффективные удобрения МЕРА в магазинах Волгограда и выигрывай 30000!
Подробности по тел. 89880057535 или на сайте www.mera1.ru

СТК
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КАЧЕСТВА

ХИТ СЕЗОНА!

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ!



МОНОФОСФАТ КАЛИЯ

20 грамм
Для подкормки любых культур

Содержит оптимальное соотношение Калия и Фосфора для максимального плодоношения культур, а также повышает стойкости растений к болезням, вредителям и заморозкам.

ГИББЕРСИБ®

0,1 грамм

Для увеличения количества завязей и стимуляции роста растений
Способствует увеличению урожая плодов, семян, клубней на 10-40% и повышает устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.

ГИДРОГЕЛЬ

10 грамм

Самообразный резервуар воды и питательных элементов
Не являясь удобрением, он способен сдерживать удобрения, протекающие мимо корней. При внесении гидрогеля в почву растение сначала потребляет доступную влагу из почвы, потом переключается на воду, хранящуюся в гидрогеле.

ООО «СТК»: 155410, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Почтовая, д. 1А.

Телефон: 8-800-551-53-37

E-mail: info@stk37.ru | www.stk37.ru
г. Волгоград, опт/розница Музей Семян 8-800-200-75-35

ХОМОКСИЛ®
от болезней
от фитофтороза, альтернариоза и других грибных инфекций

Создан побеждать
ФИТОФТОРОЗ!

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ САДУ
И ОГОРОДУ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

ГК «Евро-Семена» e-mail: office@eurosemena.ru
Тел.: +7 (495) 662-67-80 www.euro-semena.ru

6+

ЦВЕТЫ '19
И ГОРОД

XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Растениеводство и цветоводство
Озеленение и благоустройство
Ландшафтный урбанизм

22-24 АВГУСТА
Москва, ВДНХ, Павильон 75

КОНЦЕПЦИИ ЦВЕТУЩИХ ГОРОДОВ

vdnh.ru
flowers.vdnh.ru

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУТЬ К БОГАТОМУ УРОЖАЮ И КАЧЕСТВЕННОМУ ГАЗОНУ.

Большой вред овощным культурам, таким как томаты и картофель наносят фитофтороз, вспышка которого, как правило, связана с теплой и дождливой погодой. Болезнь быстро поражает посадки картофеля и томатов и всего за несколько дней может превратить ботву и плоды растений в бурую массу.

Для профилактики заболевания, растения опрыскивают фунгицидами во время бутонизации, а заболевшие - при появлении первых признаков фитофтороза. Для такой обработки можно рекомендовать воспользоваться фунгицидом контактного и системного действия, например, Хомоксил. Он эффективен в борьбе с фитофторозом, альтернариозом, пероноспорозом и другими грибными заболеваниями картофеля, томатов, огурца и лука. Разрешен к применению в теплицах. Кроме того, это один из немногих фунгицидов, применяемых для защиты винограда. Хомоксил оказывает истребляющее действие на возбудителей болезней во всех стадиях и обеспечивает длительный лечебный и профилактический эффект. Если болезни свирепствуют в плодовом саду, то для защиты яблони и груши от парши, мучнистой росы и альтернариоза применяют Хранитель. Этот фунгицид обладает выраженным лечебным и длительным профилактическим действием и подавляет вторичное развитие заболевания. Препарат отлично переносится растением и имеет гибкие сроки применения. А в условиях дождливой погоды, крайне важно, что препарат быстро поглощается растением, что снижает риск его смывания дождем.

Еще одним важным направлением использования Хранителя, является обработка цветочно-декоративных культур и газонов. Мучнистая роса, снежная плесень и ржавчина на газонах, серая гниль и различные пятнистости не только портят внешний вид растений, но и приводят к их гибели. Стоит заметить, что декоративность любых растений, страдает гораздо быстрее, чем урожайность. Поэтому, если в течение вегетации на листьях и стеблях образовался белый налет или темные пятна - проведите обработку своего цветника и сохраните дорогие сердцу растения.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ ПОЗВОЛИТ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ!

БЕРЕЗОВЫЙ ДЁГОТЬ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!



15 причин почему садоводы выбирают натуральный дёготь, а не хим. препараты

1. Колорадский жук. Картофель, баклажаны, томаты и перец будут вам благодарны, если проведете для них опрыскивание дегтярным раствором против колорадского жука. В 10 л воды растворить стружку 0,5 бруска хозяйственного мыла и добавить 4 колпачка дегтя. Таким раствором обильно смачивать кусты картофеля, а также почву в междурядьях.

2. Луковая муха. Севок за несколько часов до посадки нужно замочить в дегтярном растворе (2 колпачка дегтя на 1 л воды).

3. Морковная муха. Чтобы обезопасить морковь и другие культуры, в 10 л воды растворить 4 колпачка дегтя и поливать растения под корень.

4. Капустная муха. Чтобы отпугнуть от посадок вредителя и не дать ему отложить яйца на растениях, почву на грядке, где растут культуры семейства Крестоцветные, мульчируют перепревшими опилками, намоченными в дегтярном растворе (6 колпачков дегтя на 10 л воды).

5. Проволочник. Для защиты картофеля от этого вредителя семенные клубни перед посадкой на 40-50 минут замачивают в растворе, приготовленном из 4 колпачков дегтя и 10 л воды.

6. Паутинный клещ. При первых признаках деятельности клеща обрабатывайте растения раствором, приготовленным из 10 л воды, 18 колпачков дегтя и 1/3 бруска мыла, уделив особое внимание тыльной стороне листьев.

7. Яблонная плодожорка. Чтобы защитить садовые насаждения от «посягательств» яблонной плодожорки и не дать бабочкам произвести яйцекладку, яблони и другие деревья опрыскивают пахучим раствором. Его готовят из 10 л воды, 4 колпачков дегтя и 1/3 бруска мыла.

8. Тля. Чтобы прогнать тлю, нужно опрыскать пораженные растения дегтярным раствором 2 раза с интервалом 5-7 дней. Растворите стружку 0,5 бруска дегтярного мыла в 1 л горячей воды, добавьте

к мыльному раствору 6 колпачков березового дегтя. 0,5 л такой смеси влейте в ведро воды и обильно смочите жидкостью листья и побеги.

9. Муравьи. Налить сверху на муравейник 1-2 колпачка дегтя. Насекомые тут же начнут убежать.

10. Кроты. Чтобы прогнать этих гостей с участка, смешайте 1 флакон дегтя (100 мл) и 1/3 стакана растительного масла и пропитайте такой эмульсией куски ветоши. После этого раскопайте все кротовины, которые обнаружите на участке, вложите в каждый ход пахучую тряпку и засыпьте отверстия землей. После этого кроты быстро покинут оккупированную территорию.

11. Мыши. Березовый деготь применяют для защиты плодовых деревьев от повреждений грызунами в зимнее время. Если опасность исходит только от полевых, то пристольные круги молодых деревьев с нежной корой достаточно просто замульчировать опилками, пропитанными дегтярным раствором (6 колпачков на 10 л воды).

12. Медведка. 1 флакон дегтя (100 мл) развести в 3 л воды. Таким раствором полить норы медведок.

13. Змеи. Обработать дегтем столбики забора и дорожки через интервалы. Разводить не нужно, мазать небольшой кисточкой из бутылочки, дозу сразу определите по запаху, если запах пронзительный, значит достаточно.

14. Березовый деготь очень эффективен для дезинфекции курятников и других подсобных помещений. Для изготовления, так называемой, дымовой шашки с березовым дегтем, для обработки помещения площадью 50 м² потребуется: ведро (4-5 л), тлеющий уголь, 800 г сухих опилок и 100 мл дегтя (1 флакон).

15. Березовый деготь против парши и других бактериальных и вирусных заболеваний. В 10 л воды растворить стружку 0,5 бруска хозяйственного мыла и добавить 10-16 колпачков дегтя. Деготь способен избавить ваши растения также от многих бактериальных и вирусных инфекций, которые способны оставить вас совершенно без урожая. Чтобы предотвратить их развитие, плодовые деревья и кустарники обильно обрабатывают дегтярно-водным раствором с добавлением мыла в период появления молодых листочков.

Березовый дёготь имеет маслянистую консистенцию и плохо растворяется в холодной воде. Поэтому, сначала растворите его в небольшом количестве горячей воды, а затем получившуюся «болтушку» влейте в емкость с холодной водой. Эффект от такого пахучего средства не заставит себя долго ждать, и вы сможете в скором времени собрать щедрый урожай экологически чистых овощей и фруктов, обезопасив его от посягательств бесчисленной роты садово-огородных вредителей.

Доктор Робик®

Профессиональная линия

**Средства
для выгребных ям
и септиков**Формула №1
для всех видов
канализационных
системСильнодействующая композиция 109 из специально
отобранных культур, микроорганизмов в спорах
работает на всех участках любых канализационных
систем.www.drrobik.ru

ТЕХНОЛОГИИ ВИПЭКО

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ВИПЭКО»

г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 6, корп. 117 А

тел. +7 (495) 225 87 65

e-mail: an@drrobik.ru

рибавНа заметку дачнику
Сад и Огород без ядохимикатовВАШИМ РАСТЕНИЯМ
ПОМОЖЕТ РЕГУЛЯТОР
РОСТА РАСТЕНИЙ**Рибав-Экстра**ВСЕГО
1 мл
на 10 л
воды**ДЛЯ СЕМЯН, РАССАДЫ, САЖЕНЦЕВ:**

- повышает скорость прорастания и всхожести семян;
- усиливает рост корней;
- улучшает приживаемость рассады;
- защищает от плесневелых грибов и корневых гнилей;

ДЛЯ РАСТЕНИЙ:

- стимулирует биологические и ростовые процессы;
- поможет восстановиться растениям после повреждения вредителями, болезнями, засухой и заморозками;
- улучшает качественные характеристики;
- повышает урожайность.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ:

- не накапливается в почве, безопасен для животных, рыб, пчел и человека.

ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ:

- используется в течение всего весенне-летне-осеннего периода;
- совместим со средствами защиты растений, удобрениями.

**ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НА ВСЕХ ВИДАХ
САДОВЫХ И ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР**+7 (916) 813-63-68 | ribav@mail.ru | www.ribav.ruЗАКАЗЫВАЙТЕ НА САЙТЕ И СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА
ДОСТАВКА ПОЧТОЙ РОССИИ**ДОСТАВКА В РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ**

ООО «БИОФАРМИНВЕСТ» Московская область, Раменский р-н, п.Родники, ул.Трудовая, д.10

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ
ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ В ГРУЗИИ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА
ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И БУРОГО УГЛЯ

Гео Гумат

ГеоГумат (марки "а" – жидкий 12%).
Гуминовое органоминеральное удобрение
с микроэлементами.

Эффективное средство для:

- ☒ предпосевной обработки почвы
в любых климатических условиях;
- ☒ предпосевной обработки семян,
корнеплодов и саженцев всех типов растений;
- ☒ внекорневой обработки
в период вегетации растений

GeoFert**ГеоОрганик**

Мощный катализатор биохимических процессов,
протекающих в почве, ее биологической активности.

Препарат повышает засухоустойчивость и урожайность сельскохозяйственных культур

КОНТАКТЫ ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ:

тел: +7 (938) 1-222-888

e-mail: ooo.agrofert@mail.ru

Спрашивайте Гео Гумат в магазинах Волгограда и области,

опт/розница. Музей Семян – 8 988-005-75-35

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области. ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алехина,1)

**?ЧТО ПОКУПАЮТ
ДАЧНИКИ**

В отборе **ТОП 100** оценива-
лись **20 000** товаров от
87 поставщиков семян
и дачной химии.

Центральная Семенная База
любезно предоставила
газете Дачная АгроМЕРА
информацию о реализации
за 2016, 2017 и 2018 гг
по 600 магазинам
Волгограда и области.

**СЕМЕНА**

1. Петрушка Листовая Обыкновенная
2. Огурец Кураж F1
3. Огурец Изумрудный Поток F1
4. Петрушка Сахарная Корневая
5. Петрушка Богатырь
6. Огурец Китайский Жароустойчивый F1
7. Укроп Грибовский
8. Маттиола Двурогая Лилак
9. Укроп Кибрай
10. Салат Витаминный
11. Кабачок Грибовские 37
12. Пеларгония Палитра
13. Огурец Кустовой
14. Укроп Лесногородский
15. Огурец Китайский Болезнеустойчивый F1
16. Кукуруза Медовая
17. Дайкон Японский длинный
18. Огурец Герман F1
19. Петрушка Кудрявая Москраузе
20. Шпинат Крепыш
21. Кориандр Армянский
22. Петрушка Итальянский Гигант
23. Огурец Зятек F1 1+1
24. Базилик Лимонный
25. Огурец Теща F1 1+1
26. Огурец Феникс
27. Укроп Обильнолистный
28. Огурец Малыш
29. Редька Старт
30. Редька Клык Слона
31. Базилик Фиолетовый
32. Редис Жара
33. Укроп Грибовский 1+1
34. Огурец Журавленок F1
35. Щавель Крупнолистный
36. Огурец Маша F1
37. Редька Маргеланская
38. Редис Алешкина Любовь
39. Базилик Ереванский
40. Щавель Бельвийский
41. Дайкон Миноваси
42. Укроп Аллигатор
43. Петрушка Пикантная
44. Огурец Настоящий мужик
45. Кориандр Янтарь
46. Огурец Наша Маша F1
47. Редька зимняя черная
48. Лук Батун Апрельский
49. Огурец Мурашка F1 1+1
50. Редис Дуро

РОЗНИЦА: спрашивайте в магазинах города Волгограда и области. ОПТ: на складах СЕМЕНА-БАЗА: * в Дзержинском р-оне (Музей семян) * в Краснооктябрьском р-оне (Алехина,1)



ХИМИЯ

51. Удобрение Монофосфат калия 0,5 кг
52. Приманка Злобный Тэд 25 г
53. Завязь универсальная 2 г
54. Бусидо от колорадского жука 0,5 г
55. Лента от мух Мухояр
56. Удобрение НВ-101 6 мл
57. Фас дубль от муравьев 125 г
58. Жукоед от колорадского жука 9 мл
59. Удобрение Ортон Микро Феррум
60. Удобрение Маг-Бор 200 г
61. Тиовит Джет от болезней 30 г
62. Фитоспарин паста 200 г
63. Удобрение Сульфат Цинка 20 г
64. Удобрение Гуми-30 0,3 кг
65. Шашка серная
66. Приманка от мух Мухостоп
67. Сетка для винограда
68. Удобрение Гуми-Оми для овощей, цветов, ягод 0,7 кг
69. Танрек от вредителей 1 мл
70. Удобрение Селитра Калиевая 20 г
71. Удобрение Калимагнезия 0,9 кг
72. Удобрение Урожай+7 1 кг
73. Удобрение Карбамид 1 кг
74. Удобрение Селитра 1 кг
75. Удобрение Азофоска 1 кг
76. Удобрение Суперфосфат 1 кг
77. Искра золотая от вредителей 1 мл
78. Фитоверм от вредителей 2 мл
79. Клещегон супер от вредителей 2 мл
80. Удобрение Урожай+7 Томат, перец, баклажан 1 кг
81. Фуфанон Нова от вредителей 6,5 мл
82. Удобрение Урожай+7 Виноград 1 кг
83. Удобрение Селитра калиевая 0,5 кг
84. Удобрение Агровит-Эм 3 кг
85. Алатар от вредителей 5 мл
86. Крышка металлическая д/закатывания
87. Удобрение Борная кислота 10 г
88. Удобрение Калийфос 1 кг
89. Средство от мух Агита 25 г
90. Триходерма вериде 30 г
91. Удобрение Здравень Универсальный Турбо 30 г
92. Биотлин от тли 3 мл
93. Медный купорос 100 г
94. Эпин экстра 1 мл
95. Удобрение Гуми-Оми Томат, перец, баклажан 0,7 кг
96. Биоксил от вредителей 4 мл
97. Удобрение Гуми-Оми Огурец, кабачок, бахча 0,7 кг
98. Удобрение Сульфат Магния 30 г
99. Абига пик 50 г
100. Корадо от колорадского жука 1 мл

?ЧТО ПОКУПАЮТ ДАЧНИКИ



БЕЛАЯ МАЛИНА

Малина (*Rubus idaeus* L.) – это вид, который включает разновидности сортов с ягодами от пурпурного, темно-бордового до светло-абрикосового цвета. Светлоокрашенные сорта называют белой малиной. Эти ягоды обладают диетическими свойствами, они богаты природным сахаром, фруктовыми кислотами, пектином, витаминами С, В9, макро- и микроэлементами.



Биологические особенности

Кусты и ягоды похожи на обычную малину. Селекционеры выбирали для скрещивания образцы малины и ежевики, не содержащие природных красящих веществ – антоцианов. В результате получились разновидности с окраской плодов от светло-абрикосовой до ярко-оранжевой, в них содержится больше сухих веществ, глюкозы, фруктозы и пентозы по сравнению с обычной малиной, поэтому они в ряде случаев вкуснее и прекрасно подходят для медленной сушки и заморозки.

Кусты образуют корневище, которое дает множество ответвлений в разные стороны неглубоко в почве, из которых вырастают порослевые побеги. Поросль истощает материнское растение, но в природе таким образом происходит размножение кустарника. Плодовые веточки образуются на концах побегов второго года или в пазухах листьев, тогда плодоношение бывает один раз за сезон, после чего побеги отмирают.

Если плодовые почки закладываются на побегах текущего и второго года, то плодоношение происходит двукратно за сезон – это явление называют ремонтантностью.

Разновидности белой малины различаются биологическими признаками:

- силой роста побегов и их раскидистостью (сильно-, средне- и слаборослые и раскидистые);
- по цвету коры побегов второго года (серые, светло-коричневые, коричневые);
- типом шипов и их расположением (простые, изогнутые, в нижней части или по всей длине побега);
- типом листьев (слабо-, средне-, сильноморщинистые, с опушением или без, скрученные или нет);
- типом ягод (тупоконические, конические, округлые, с опушением или без, слабо-, средне-, сильноароматные);
- по типу плодоношения – ремонтантные или однолетнего плодоношения.

Сорта белоплодной малины

В садах можно встретить сорта, внесенные в государственный реестр (Абрикосовая, Беглянка, Желтый гигант, Золотая осень, Золотые купола, Оранжевое чудо, Янтарная) или давно возделываемые поколениями любителей этой вкусной ягоды (Ананасная, Алтайская десертная, Голден Эверест, Корнуэльская Викто-

рия, Медовая, Сладкая желтая, Спирина белая).

Абрикосовая – районирован в Центральном регионе, ремонтантный сорт. Кусты средней силы роста, побеги в средней степени раскидистые. Шипы в нижней трети ветвей, загнуты вниз. Ягоды мелкие (3 г), золотистого цвета, слабо опушенные, богаты витамином С. Урожайность с куста не менее 4 кг за сезон;

Беглянка – районирован в Центральном регионе, ремонтантный. Второй урожай созревает рано – в начале августа. Сила роста побегов средняя, раскидистость слабая. Шипы мелкие, сосредоточены в нижней части побегов. Ягоды почти округлые, 2,5 г, золотисто-абрикосовые. Урожайность с куста 2,5-3,0 кг, морозостойкий;

Желтый гигант – районирован в Северо-Западном регионе, ремонтантность отсутствует. Урожай созревает в конце июня. Сила роста высокая, побегов образуется много, раскидистость слабая. Шипы по всей длине ветвей, листья средней степени скрученности. Ягоды 3 г, нежно желтые, урожайность 1,5-2,0 кг с куста. Устойчив к болезням и вредителям, зимостойкость низкая;

Золотые купола – районирован в Центральном регионе, ремонтантный. Рост побегов и раскидистость средние. Шипов немного, они рассредоточены по всей длине побега. Листья в слабой степени скручены. Ягоды правильной округлой формы, ярко желтые, достигают 4 г. Урожайность 3 кг с куста, болезнями и вредителями не поражается;

Золотая осень – районирован повсеместно, ремонтантный, плодоношение до морозов. Сила роста средняя. Шипы мягкие, небольшое количество в нижней части побегов. Листья морщинистые, почти не скрученные. Ягоды удлиненные, золотистые, достигают 5 г, урожайность с куста до 5 кг за сезон с учетом двух урожаев. Требуется защита от вредителей и болезней;

Оранжевое чудо – районирован повсеместно, ремонтантный. Сила роста высокая, раскидистость средняя, шипы присутствуют в разной степени по всей длине побега. Листья морщинистые, сильно скрученные. Ягоды крупные, удлиненные, оранжевые, блестящие, до 10 г, рекордсмен по содержанию витамина С. Урожайность 5 кг с куста и выше;

Янтарная – районирован повсеместно, ремонтантный. Сила роста высокая, раскидистость средняя. Шипы загнуты, располагаются в нижней части побегов. Листья гофрированные, слабо закрученные. Ягоды разнокалиберные от 3 до 7 г, округлые, оранжевые. Урожайность 3,5 кг с куста. Выдерживает засуху.

Посадка и уход

Белую малину сажают рядами. В зависимости от силы роста и раскидистости кустов, между ними оставляют по 0,7... 1,2 м, междурядья 1,5-2,0 м. Для прямостоячих кустов шпалеру можно не обустраивать. Глубина посадки 18-25 см. Почву мульчируют торфом. Формируют кусты с числом побегов от 7 до 9.

Малине необходим регулярный полив и подкормки полным комплексом удобрений. Против болезней – мучнистая роса, серая гниль, пурпуровая пятнистость кусты обрабатывают препаратом Топаз. После сбора летнего урожая старые побеги вырезают, кусту дают подкормку Азофоской по 30-40 г на 1 погонный метр ряда.

Ремонтантные сорта рекомендуются на зиму скашивать до уровня 5 см над землей, на следующий год проводить сбор высококачественных плодов один раз в конце лета.

Посадите в своем саду белую малину, и она обязательно щедро одарит урожаем полезных и вкусных ягод!

ЕСЛИ ВАША ЯБЛОНЯ, ГРУША ИЛИ ДРУГОЕ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО В ОДИН ГОД ДАЕТ МНОГО ПЛОДОВ, А В СЛЕДУЮЩИЙ "ОТДЫХАЕТ", ЗНАЙТЕ, ВАМ НЕОБХОДИМО БОРОТЬСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ПЛОДНОШЕНИЯ.

Периодичность плодоношения представляет собой такое явление, когда плодовые деревья дают в одном году чрезмерно высокий урожай плодов (чаще плохого качества), а в следующее остаются без плодов.

Это свойственно большинству пород и сортов. Наиболее резко пе-

конца июня по август) возникает дефицит синтезированных веществ (углеводы, белки). В результате закладка



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛОДНОШЕНИЯ – ЧТО ЭТО И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

риодичность плодоношения проявляется у яблони, меньше – у косточковых пород.

ФАКТ!

Полностью избавиться от периодичности плодоношения невозможно. Но с этим явлением можно бороться, создавая для деревьев условия, при которых они будут давать хороший урожай в текущем году и закладывать цветковые почки для урожая следующего года.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ДЕРЕВО ПЛОДНОСИТ ЧЕРЕЗ ГОД?

Значительное влияние на периодичность плодоношения оказывают:

- подвой (растение, на которое прививают черенок или почку другого сорта или вида);
- условия выращивания.

Причиной перехода деревьев от ежегодного (регулярного) к периодичному плодоношению является перегрузка их цветковыми почками и высоким урожаем при ослабленном поступательном росте. Для ежегодного плодоношения необходимо, чтобы одновременно с развитием плодов текущего года на дереве закладывались цветковые почки для урожая следующего года.

ДЛЯ СПРАВКИ. Ежегодный прирост ветвей считается хорошим, если выросшая за год часть побега имеет длину не менее 30 см.

При образовании чрезмерно большого количества плодов в момент закладки цветковых почек (с

цветковых почек становится невозможной. Поэтому дерево в последующий год не плодоносит.

В неурожайный год растение не затрачивает ассимиляты (органические соединения – углеводы, сахара, аминокислоты и проч. – необходимые растению для роста и поддержания жизнедеятельности) на питание плодов. Поэтому создаются условия для закладки большого количества цветковых почек. Так возникает чередование урожайных лет с неурожайными.

ФАКТ!

Иногда дерево может не плодоносить два года подряд. Это вызвано тем, что в урожайном году оно было сильно ослаблено, и цветковые почки у него не заложились и на второй год.

Периодичность плодоношения у дерева обостряется при:

- интенсивном росте;
- старении;
- ослаблении роста;
- перегрузке генеративными (цветковыми) почками, особенно у зимних и осенних сортов яблони и груши.

При этом плоды мельчают и не приобретают естественной окраски. Если не бороться с периодичностью, плоды будут с каждым годом мельчать.

Периодично плодоносящие деревья в год плодоношения расходуют весь свой запас углеводов, белков и синтезируемые ассимиляты для формирования большего урожая. Деревья истощаются, и

ростовые процессы угнетаются, запасные питательные вещества не накапливаются.

При благоприятных же условиях (отсутствие заморозков во время цветения, своевременная защита от цветоеда, сбалансированное питание) у деревьев закладывается слишком много цветковых почек. Что также не очень полезно.

Некоторые садовые культуры регулируют количество плодов, сбрасывая лишнюю завязь (в средней полосе это происходит в июне). Однако у яблони, груши, персика, сливы этот механизм саморегулирования развит недостаточно, и плодов вырастает все равно очень много. А это, в свою очередь, сдерживает формирование плодовых почек, из-за чего в следующем году урожай снижается.

КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ПЛОДНОШЕНИЯ?

Существует несколько способов регулирования плодоношения:

- интенсивная обрезка кроны;
- внесение повышенных доз удобрений;
- прореживание цветков и завязей.

Сильная обрезка и обильное питание провоцируют дерево на активный рост, умеренное плодоношение и формирование побегов резервного плодоношения для последующего урожайного года. Если соблюдать все правила, эти приемы помогают избежать периодичности.

Также можно прибегнуть к ручному прореживанию, оставляя на

дереве только завязи лучшего качества. Причем расстояние между соседними завязями должно быть в пределах 10-20 см. На одну завязь должно приходиться 10-30 листьев. У крупноплодных сортов необходимо оставлять 10 листьев на плод, а у сортов летнего срока созревания – 30 листьев.

НА ЗАМЕТКУ! Прореживание завязей в конце июня – начале июля не оказывает особого влияния на регулярность плодоношения, однако значительно улучшает качество плодов.

КАК ПРАВИЛЬНО УДАЛЯТЬ ЗАВЯЗИ?

Прореживание завязей наиболее эффективно на молодых деревьях. Чтобы получить хороший результат, этот прием проводят во время цветения или сразу после

него. Лучше всего удалять лишние завязи при помощи секатора.

У обильно цветущих деревьев можно удалять не отдельные цветки, а целые соцветия. Однако этот прием всегда связан с риском. При обычных условиях, если во время цветения дерева случаются заморозки, цветки, раскрывшиеся позже, не вымерзают. А если мы удаляем завязи целиком, велика вероятность лишиться существенной части урожая.

Если хотите ежегодно собирать хороший урожай яблок, груш, слив и других плодов, следуйте этим советам. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать.



НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ — ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ РОСТА ГЕРАНИ

Герань у меня растет уже очень давно. На лето герань высаживаю в сад, а осенью снова рассаживаю в горшки. Поэтому после пересадки растение нужно подкормить, чтобы герань хорошо росла. Для этого у меня есть одно хорошее удобрение — нашатырный спирт.

Нашатырный спирт, наверное, есть в каждой аптечке в доме. Поэтому его удобно использовать, поскольку он всегда под рукой. Я не зря использую данный препарат для растений, ведь в нем есть 10% аммиака, который в свою очередь состоит из 90% азота. Поэтому, по моему мнению, нашатырный спирт является одним из лучших удобрений для роста герани.

КАК ПОДКОРМИТЬ ГЕРАНЬ ДОМА

Подкормить герань нашатырным спиртом можно два раза в месяц. Но лучше всего ориентироваться по состоянию герани. Если у растения пышная и яркая листва, то лучше не перебарщивать с азотом. Ведь переизбыток, как и не достаток микроэлементов приводит к плохим результатам.

Для приготовления раствора в 1 л воды разводим 1 ч. л. нашатырного спирта. Полученным раствором поливаем герань. За день до внесения удобрения проливаем герань простой водой. А на следующий день поливаем подкормкой. Лучше всего поливать утром или вечером.



Также очень важно отметить то, что нашатырный спирт не только хорошее удобрение. Ведь это средство эффективно защищает растение от вредителей, которые часто возникают на цветах.

Цветовод,
Татьяна Денисова

ДЕКОР УЧАСТКА – БОРДЮРЫ

БОРДЮРЫ В ДЕКОРЕ САДОВОГО УЧАСТКА ВЫПОЛНЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ЭСТЕТИЧЕСКУЮ РОЛЬ, ВИЗУАЛЬНО РАЗДЕЛЯЯ ПРОСТРАНСТВО. ГЛАВНОЕ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ОБОЗНАЧАТЬ ГРАНИЦЫ МЕЛКИХ ЗОН И ДОРОЖЕК. В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫБОР КУЛЬТУР ДЛЯ БОРДЮРА ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ, КОГДА ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КРАСОТУ РАСТЕНИЯ НУЖНО СОЧЕТАТЬ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ И ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА. И ЗДЕСЬ ПРЯНЫЕ ТРАВЫ – ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО.

Виды бордюров

Бордюры из растений различаются своими параметрами:

- по высоте – могут быть низкие (7-25 см), средние (25-75 см), высокие (выше 75 см);
- по ширине – узкие (20-35 см), широкие (35-75 см);
- по выращиваемым видам растений – одновидовые, многовидовые (миксбордеры);
- по продолжительности существования – однолетние и многолетние;

Подбирая растения для миксбордеров, принимают во внимание сроки цветения растений, чтобы обеспечить максимально долгий период высокой декоративности бордюра. На фото ниже представлен широкий многовидовой бордюр из пряных трав.



Обратите внимание, что широкому бордюру, на котором выращивается несколько видов растений, необходима окантовка из кам-

ня, дерева, пластмассы или любого другого материала, что наглядно проиллюстрировано на фото ниже. Кроме того, окантовочный материал для бордюра из пряных трав, например мяты, должен быть закопан на глубину не менее 40 см, чтобы перекрыть распространение корневых отпрысков за пределы бордюра.

Что посадить в ароматный бордюр?

Пряно-вкусовые травы, как правило, обладают высокой способностью к отращиванию. Приготовьтесь к тому, что вам придется срезать все растения бордюра на одинаковую высоту, как бы вы подстригали любой другой бордюр. В противном случае высоко эстетического вида от этого элемента ландшафта не получить.



Разные сорта отличаются по окраске листьев, из таких растений можно создать миксбордер. Для мяты необходима плодородная, хорошо дренированная почва. Наилучшая ширина полосы – 40-45 см. Растения будут хорошо развиваться, если почву в течение лета несколько раз мульчировать компостом или перегноем.

Душица обыкновенная

Садовые центры предлагают несколько разновидностей душицы от среднерослых стелющихся видов с невзрачными голубовато-фиолетовыми цветками до высокорослых с крупными ярко розовыми цветками. Все виды многолетние, хорошо переносят условия зимы, прекрасно подходят для срезки.



Тимьян (чабрец)

Ароматная трава для чая, очень полезна зимой в качестве средства от кашля. Многие разновидности тимьяна стелющиеся, поэтому на каждый погонный метр бордюра достаточно посадить 4-5 растений. Побеги, которые выходят за преде-



Мята

Разновидности мяты, включая мелиссу, прекрасно подходят для создания бордюра средней высоты.

ИЗ 10 ВАРИАНТОВ ПРЯНЫХ ТРАВ

лы гряды, регулярно подстригаются, тем самым создается очень аккуратный невысокий бордюр.

Шалфей

Многолетнее лекарственно-декоративное растение с цветками в виде высоких свечек от темно-синего до темно-фиолетового цвета, богато эфирными маслами. Декоративные сорта могут быть красного и желтого цвета. В качестве пряности выбирают сорт шалфей мускатный, его лепестки розово-фиолетового цвета, а само растение достаточно крупное – может достигать 1 м. С его помощью создают высокие ароматные «стены».



Лаванда узколистная

Многолетний вечнозеленый кустарничек высотой до 60 см. Поскольку лаванда не выносит морозных зим, для бордюра из нее выбирают место, защищенное от ветров, хорошо прогреваемое, и с таким расчетом, чтобы на зиму над кустом можно было соорудить каркас с временным укрывным материалом.



Бasilik огородный

С помощью разновидностей базилика создается однолетний средний и высокий бордюр. Семена высевают на рассаду в домашних условиях в марте, высадка в грунт – в начале мая.

Эстрагон

Эта ароматная трава известна как тархун или эстрагонная полынь. Посадки тархуна многолетние, измельченная трава используется как приправа к домашним консервациям и мясным блюдам. Кусты эстрагона присыпают перегноем 2-3 раза за лето и обязательно перед зимовкой.



Майоран

Создает многолетний бордюр высотой до 50 см, приправа для широкого спектра блюд – от выпечки до овощных и мясных рагу. Растение теплолюбивое, для него необходимо предусмотреть зимнее укрытие, предпочитает редкие поливы.



Анис обыкновенный

Из аниса можно создать однолетний бордюр высотой до 60 см, во время цветения дает зонтики с ароматными семенами, подобно укропу. Почву под анис выбирают легкую – супесчаную, за лето дают 2-3 подкормки комплексом минеральных удобрений.

Фенхель

Заросли фенхеля дают высокую ароматную живую изгородь высотой более 1 м. Кусты развиваются мощные, на верхушках образуют зонтики, в основании побегов формируется кочан, мясистые листья которого добавляют в салаты и консервируют как самостоятельное блюдо. Дольше двух лет растения держать не рекомендуется, так как побеги становятся грубыми.

Для фенхеля нужно создать плодородный слой глубиной 25-30 см, чтобы обеспечить накопление питательных веществ в кочане. Уход за культурой заключается в частых поливах, прополках и рыхлении. На зиму кусты укорачивают.



Как правильно сушить травы

Ароматные травы срезают веточками и связывают в небольшие букеты, которые сушат, подвесив вертикально в хорошо проветриваемом помещении. Оптимальные условия для сушки трав создаются под навесом. Если сушится одновременно много сырья, возможно понадобится помощь вентилятора. Важно, чтобы на заготовки не попадал прямой солнечный свет, иначе сырье будет стремительно терять витамины, ароматические и эфирные вещества.

Итак, постарайтесь создать ароматный бордюр на вашем садовом участке. Помимо эстетического удовольствия, вы получите ценные приправы для домашней кулинарии, серьезно сэкономив на покупке готовых трав. В саду же ароматы играют особую роль, преграждая доступ вредным насекомым к плодовым и овощным культурам. Надеемся, что наши рекомендации будут вам полезны!

Интеркалярный подвой – промежуточная вставка между подвоем и культурным сортом, служит для ускорения вступления в плодоношение и снижения силы роста дерева.

Интеркалярный рост – способ роста побегов, когда они растут нижними частями своих междоузлий.

Ирригация – искусственное орошение недостаточно увлажненных почв для повышения их плодородия.

Иошта – гибрид крыжовника и черной смородины.

Калибрование семян – разделение партии семян на фракции по размеру.

Каллюс – вновь образованная ткань растения, развивающаяся на мете повреждения и способствующая заживлению ран.

Камбий – клетки ткани, способные к усиленному делению в стеблях и корнях растений. Находится между корой и древесиной. Обеспечивает зарастание ран, срастание прививок, образование дополнительных корней.

Капельный полив – подача воды к корням растений малыми порциями с помощью точечных микровыводов, уложенных в грунт или расположенных на поверхности.

Капиллярная влага – часть свободно-передвигающейся капиллярножидкой воды, которая наполняет тончайшие капилляры почвы и удерживается в них силой поверхностного натяжения менисков пор.

Капиллярность – свойство жидкостей, всасываясь, подниматься или опускаться по каналам (капиллярам).

Кастрация цветков – удаление тычинок из обоеполых цветков для последующего искусственного опыления в селекционных целях.

Катавлак – отводок кустом корнесобственного винограда как способ его омоложения.

Катаровка – удаление всех корней винограда, идущих от подземного штамба в пределах 15-20 см от поверхности почвы.

Кербовка – поперечные или полулунные надрезы или удаление небольшой (шириной 2-4 мм) полоски коры для усиления (над почкой) или ослабления (под почкой) силы роста почки (ветви). Кербовку делают во время сокодвижения.

БИОСТИМ - СТИМУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ

Это совершенно фантастическая история. В конце семидесятых Георгий Александрович Протопопов, кандидат биологических наук, выделил из растений вещество, активизирующее синтез ДНК и ускоряющее деление клеток всех растений, а также микробов. Препарат показал сильнейшую активность. Вдвое ускорилось прорастание семян, увеличился урожай, продлился срок плодоношения, в 2-3 раза повышалась устойчивость к болезням и скачкам климата, к заморозкам и засухе. Биостим пять лет испытывался по всей стране — от Молдавии до Камчатки, от Карелии до Грузии. Везде эффект был одинаковым.

Протопопова осаждали директора совхозов. А на его опытных участках происходили удивительные вещи. Виноград успевал дать два урожая под пленкой и третий — на пасынках. Томаты стали многолетними: стволы оставались зимовать под укрытием и весной отрастали. Мощност растений увеличивалась, урожай рос на 4 кг/м² в год, и на третий год достиг 12 кг. Биостим оздоравливал почву, быстро превращал отходы в перегной. Влиял даже на продуктивность животных. И тут случилось то, что и должно было: Протопопова внезапно «ушли», сняли с работы и всех его единомышленников. В середине девяностых его отыскал и «вытащил на свет» Юрий Иванович Слащинин, лидер сообщества «Народный опыт», увлеченный пропагандист органического земледелия. Он стал писать о Биостиме в своем журнале «Жизнь земная» и помог увеличить его производство в Петербурге. Сам он активно распространяет Биостим.

Биостим потребен в количестве 0,01 грамма (!) на сотку. Особенно сильно воздействует при замочке семян, в стадии всходов и рассады. Достаточно двух обработок молодых растений. Повышает укореняемость черенков до 100%.

Если опрыскать Биостимом почву рано весной, то все, кто питается живыми растениями, быстро пробуждаются — и гибнут от бескормицы и холода. Почему же не пробуждаются полезные микробы? Потому, что их пища — уже мертвая органика, и активные вещества, выделяемые корнями пробуждающихся растений, для них интереса не представляют. А вот когда они уже проснутся от тепла, тут Биостим может помочь им размножиться на порядок быстрее, чем обычно.

Семена и черенки замачиваются на 1-24 часа в том же растворе, что готовят для опрыскивания: 0,03 грамма на 60 литров воды. Вместе с препаратом важно приобрести «Методику применения», разработанную самим Протопоповым: там подробно описано, как разводить растворы.

Николай КУРДЮМОВ,
ученый-агроном.
Глава «Защита
вместо борьбы



На правах рекламы

КАК ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ УПРЯМОЕ РАСТЕНИЕ



Вроде ухаживаешь за огородом и удобрения вносишь, но урожай мог быть и повесомее: помидоры покрупнее, стебли сельдерея потолще, да и огурцов хотелось бы побольше. Такой проблеме можно помочь... стимуляторами.

Стимуляторы вырабатываются и самими растениями. Они влияют на урожайность, скорость развития. Просто растения вырабатывают их мало, а если мы их внесем дополнительно, то можно повлиять на развитие растений. Как повлиять, зависит от того, что используем. Все стимуляторы делятся на четыре группы:

- **ауксины** (отвечают за развитие корневой системы и распределение полезных веществ по всему растению);
- **гиббереллины** (накапливают полезные вещества, тем самым стимулируют прорастание семян, цветение и формирование плодов, выводят из состояния покоя клубни и луковицы);
- **цитокнины** (способствуют делению клеток, пробуждению и росту почек);
- **брасины** (поддерживают нормальное функционирование иммунной системы растений, а также регулируют процессы созревания плодов и семян).

Но собственных фитогормонов растению (особенно если вы ждете от него рекордных показателей по росту и урожайности) зачастую бывает недостаточно. Чтобы помочь ему лучше расти и развиваться, применяют их синтетические заменители.

В отличие от стимуляторов регуляторы роста растений не ускоряют, а регулируют их рост, т.е. помогают одним частям растения развиваться быстрее других.

Сегодня в продаже имеется множество искусственных заменителей фитогормонов, направленных на решение самых разных проблем растений. Вот некоторые из них:

Биостим
Зацветай
Бутон
Завязь
Партенокарпин
Томатон
Агrostимул
Гибберсиб
Цветень
Плодотим

Использование регуляторов роста и развития растений в сельском хозяйстве преследует множество целей: от увеличения урожайности или предотвращения полегания злаков до повышения засухоустойчивости и снижения содержания нитратов.



Кильчевание черенков – предпосадочная подготовка черенков для перевода их из состояния относительного покоя в состояние жизнедеятельности путем создания неодинаковых условий для нижней и верхней части, способствующая ускорению образования корневых зачатков.

Кислая почва – реакция почвенного раствора от 3 до 6 pH.

Кислотность почвы – свойство почвы, обусловленное наличием в почвенном растворе водородных ионов. Обозначается pH.

Клон – генетически однородное потомство, полученное от одной исходной особи вегетативным размножением (прививкой, отводками, отпрысками, черенками, розетками, листьями...).

Клоновые подвои (карликовые, полукарликовые) – растения, размножаемые вегетативно. Отличаются слабой и средней силой роста.

Клубень – однолетний подземный побег растения с утолщенным стеблем и зачаточными листьями, из пазушных почек которых на следующий год вырастают новые побеги. В клубне накапливаются запасные питательные вещества.

Рабатка – длинная узкая грядка с декоративными растениями.

Раздельнополюе цветки – цветки с обособленными мужскими или женскими органами. Могут быть на одном или на разных растениях.

Ремонтантность – способность растений некоторых культур и сортов к многократному плодоношению в течение одного вегетационного периода.

Ренклоды – сорта сливы с округленными плодами.

Репелленты – природные или синтетические вещества, отпугивающие своим запахом вредителей.

Ретарданты – химические вещества, замедляющие рост растений.

Ротация – полный цикл чередования сельскохозяйственных культур в севообороте.

Саженец – молодое растение, пересаженное из другого места.

Самобесплодность (самостерильность) – неспособность растений данного сорта плодоносить без опыления их цветков пыльцой с цветков другого сорта.

Самоопыление – перенос пыльцы в пределах одного цветка.

Самоплодность – способность растений данного сорта хорошо

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ ПЕСТИЦИДЫ



В хозяйствах многих регионов России нередко возникает проблема – приобретенный фирменный пестицид не сработал на должном уровне – в чем причина?! В большинстве случаев виновата вода, так как многие пестициды чувствительны к щелочному гидролизу. Проще говоря, распадаются при pH воды больше 7.

Вода хорошего качества является важным аспектом при смешивании и приготовлении рабочих растворов пестицидов. Вода должна быть чистой и иметь оптимальные для обработки физико-химические характеристики. Вода плохого качества может снизить эффективность обработок пестицидами, агрохимикатами и повредить оборудование для внесения.

Существует несколько параметров качества воды, которые влияют на ее химическую природу.

Загрязненность. В грязной воде содержатся маленькие частицы ила или глины. Эти почвенные частицы могут поглощать, или связывать активные ингредиенты химических веществ, и снижать их эффективность. Это особенно относится к глифосатам. Грязь может засорять форсунки, линии и фильтры, а также снижать производительность и срок эксплуатации опрыскивателя.

Жесткость воды. Вода считается жесткой, при высоком процентном содержании солей кальция и магния. Жесткая вода может вызвать выпадение в осадок некоторых химических элементов (фосфор). Как правило, чувствительные химикаты часто содержат добавки, которые помогают преодолеть эту проблему. Известно, что такие гербициды как глифосаты, 2,4 D аминная

соль и МЦПА к-ты (гербитокс, агри-токс), клопиралиды, подвержены воздействию жесткой воды. Жесткая вода также может повлиять на баланс системы поверхностно-активных веществ и, следовательно, на такие свойства, как: увлажнение, эмульгирование и дисперсия. Очень жесткая вода может снизить эффективность веществ, используемых для очистки грязной воды.

pH уровень воды. Большинство из природных вод имеют pH показатель между 6,5 и 8. В высоко щелочных водах (pH>8) многие химикаты проходят процесс щелочного гидролиза. Этот процесс вызывает распад активных ингредиентов, который может снизить эффективность пестицидов. Это одна из причин, по которой не следует оставлять рабочие смеси для опрыскивания даже на одну ночь. Особо чувствительны к щелочной среде глифосаты. Высоко-кислотная вода также может повлиять на стабильность и физические свойства химических соединений.

Растворенные соли. Общее количество минеральных солей, растворенных в воде, обычно измеряется с помощью электропроводности (ЭП) воды. ЭП воды в скважинах и дамбах зависит в большей степени от уровня солей в скалистой породе и почве, которые их окружают. Во время засухи уровень солей в воде повышается. Очень соленая вода может вызвать затруднения при растворении кристаллических агрохимикатов и засорение оборудования, а также является более устойчивой к изменениям pH. Для измерения общего количества растворенных в воде солей применяют портативный прибор, т.н. кондуктометр.

Органическое вещество. Вода содержит много органических веществ, таких как растительные остатки, водоросли и простейшие организмы, которые блокируют форсунки, линии и фильтры. Водоросли также могут вступать в реакцию с некоторыми химическими веществами, снижая их эффективность.

Температура. Очень горячая или холодная вода может негативно повлиять на растворимость и действие некоторых химических элементов.

Различные торговые марки одних и тех же химикатов могут по-разному реагировать на pH, в зависимости от содержащихся в соединениях добавок. Если приходится использовать воду низкого качества, опрыскивание производят сразу после смешивания.

Повышение качества воды. Вода с большим содержанием кальциевых или магниевых солей (жесткая вода) может вызвать проблемы со смешиванием, так как стабильность суспензии и эмульсии снижается. Активность глифосата снижается при наличии высокого уровня кальциевых и магниевых солей, а также при наличии гидрокарбоната натрия. Это явление можно преодолеть путем добавления препаратов содержащих кислоты и буферные добавки. Если известно, что вода щелочная, опрыскивание следует начинать немедленно после смешивания.

Многие пестициды восприимчивы к щелочному гидролизу (разрушение в щелочной среде) и солям жесткости, а также фунгициды восприимчивы к щелочному гидролизу. При pH 4–7, период полураспада определенных органофосфатов составляет от 1/2 до 1 дня. При pH 7,5 или выше, период полураспада при нормальной рабочей температуре может сократиться до 20 минут. Некоторые гербициды также могут быть зависимы от pH уровня. Низкий уровень pH усиливает активность некоторых ингредиентов гербицидов, делая их более эффективными. Кроме того, сегодня многие хозяйства совмещают обработки средствами защиты растений с листовыми подкормками. Оптимальный уровень pH рабочего раствора обеспечивающий максимальную эффективность листовых подкормок и усвоение элементов минерального питания находится в пределах pH от 5,0 до 6,5.

Источник: официальный сайт Россельхозцентра

ИЮЛЬ – ПЕРЕЛОМНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ РАССАДНЫХ КУЛЬТУР

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ ТОМАТЫ, ПЕРЦЫ И БАКЛАЖАНЫ ОНИ ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВЫ НА ПОДКОРМКИ И БЛАГОДАРЯ ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ ПОВЫШЕНИЕМ УРОЖАЯ, ПРИЧЁМ ПЛОДЫ СТАНОВЯТСЯ ВКУСНЕЕ И АРОМАТНЕЕ.

В качестве удобрений рекомендуем применять полноценные комплексные органоминеральные смеси, например, **Гуми-Оми Томат, перец, баклажан**. Удобрения из этой серии недаром носят титул «мягкие» – они содержат и органическую, и минеральную составляющую, благодаря чему обладают преимуществами обоих типов подкормок. Используйте это удобрение на следующий день после полива или обильного дождя, когда земля слегка влажная. Распределите **Гуми-Оми** в междурядьях из расчёта 1 столовая ложка на 2 м² и взрыхлите землю.

С середины июля характер подкормок рассадных культур следует изменить. Дело в том, что в этот период растениям уже не нужно столько азота, как во время роста вегетативной массы, а нужен фосфор и калий для формирования плодов. Поэтому во второй половине лета начинайте применять именно **Гуми-Оми Осенний**, либо **Гуми-Оми Фосфор** и **Гуми-Оми Калий**. Их тоже удобнее использовать в сухом виде, внося в почву при рыхлении междурядий.

Еженедельно проводите пасынкование и постенно удаляйте нижние стареющие листья, особенно имеющие контакт с почвой, так как через них растения могут подхватить опасное заболевание – фитофтороз. Не путайте естественный процесс старения листьев с хлорозами от дефицита элементов питания! Если у растений такое случается, проведите опрыскивание раствором **Богатый-Микро Комплексный** или **Богатый-Микро Железо** (когда бледнеют верхушки растений). В конце июля сделайте прищипывание верхушки индетерминантных сортов. После хирургических процедур необходимо опрыскивание раствором **Фитоспорина-М Реаниматор** (1:20), чтобы через ранки не проникла инфекция.

Помочь завязыванию плодов можно с помощью биопрепарата **Борогум-М**. За время цветения проведите два опрыскивания этим удивительным средством с интервалом в две недели. Активный бор в Борогуме мгновенно поступает в ткани растений и доставляется к месту назначения.



20 ДЕЛ, КОТОРЫЕ НУЖНО



ИЮЛЬ – МЕСЯЦ-ЭКВАТОР, ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ. УЖЕ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ, ДОПУЩЕННЫМИ НА ЭТАПЕ ПОСАДКИ, НО И СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩИЙ УРОЖАЙ. И ВСЕ ЭТО – БЕЗ ОТРЫВА ОТ "ПРОИЗВОДСТВА"!

По сравнению с посадочным маем и урожайным августом, июль можно было бы назвать месяцем передышки.хлопоты и тревоги, связанные с посевными работами, остались позади, до жаркой уборочной страды пока еще далеко, но бдительный дачник не дремлет и продолжает нести свою вахту на родных шести сотках.

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ В САДУ В ИЮЛЕ

1. Подкормите ягодные кустарники. Июль – время созревания ягод. Недостаток питательных веществ скажется на качестве урожая. Если на вашем участке растут малина, смородина или крыжовник, позаботьтесь о том, чтобы они не испытывали дефицита макро- и микроэлементов.

2. Регулярно поливайте кустарники и деревья. Недостаток влаги отражается на растениях гораздо хуже, чем дефицит питательных элементов. Во многих регионах июль – самый жаркий месяц года, поэтому именно в этот период особое внимание стоит уделять именно поливу деревьев и кустарников.

Приблизительные нормы полива:

- молодой куст – по 1-2 ведра воды (10-20 л);
- взрослый куст – по 3-4 ведра;
- неплодоносящий саженец – 3-5 ведер (30-50 л);
- 3-5-летнее дерево – 5-8 ведер (50-80 л);
- 7-10-летнее дерево – 12-15 ведер (120-150 л).

3. Защитите свой урожай от птиц. В июле уже созревают черешня, вишня, абрикос. К этому же времени успевает подрасти и набраться сил молодое поколение птиц. Убереечь урожай от пернатых соседей помогут развешивающиеся на ветру флажки из фольги или накинутая на кустарник старая рыбацкая сеть.

4. Проведите обрезку. Июль – самое время для удаления "лишних" ветвей, которые успели нарасти на деревьях со времени их последней обрезки. Избавьтесь от всей прикорневой поросли и всех вертикально растущих побегов на верхнем ярусе ветвей. Частично удалите сильные побеги, которые появились на черешне и сливе после снижения кроны. Приведите в порядок скелетные ветви деревьев.

5. Заложите основу будущего урожая. Именно в июле начина-

ют закладываться плодовые почки, которые и станут основой вашего урожая в следующем году. Поэтому важно, чтобы в этот период растение не испытывало нужды в питательных веществах. Внекорневые подкормки комплексными удобрениями – как раз то, что нужно вашим деревьям и кустарникам.

6. Своевременно собирайте ягоды. Сбор ягод – дело ответственное и не терпящее отлагательств. Стоит вам только зазеваться и вовремя их не снять, как они тут же попадут на "шведский стол" к вашим пернатым соседям, станут приманкой для вредителей-сладкоежек или просто-напросто сгниют, пав жертвой какого-нибудь грибка с труднопроизносимым названием.

7. Позаботьтесь о клубнике. После того как вы снимете с куста последнюю ягоду, не забудьте сказать "спасибо" своей садовой землянике. Подрыхлите почву вокруг растений и простимулируйте рост корневой системы, окучив кустики. Ну и конечно, не стоит забывать о регулярной обрезке усов. Своевременная "стрижка" быстрорастущих усов (если вы не собираетесь использовать их для размножения) повысит зимостойкость вашей

СДЕЛАТЬ В ИЮЛЕ В САДУ И ОГОРОДЕ

зеленокудрой ягодной красавицы.

8. Приведите в порядок прививочный инструментарий. Самое время начать подготовку к летним прививкам. Чтобы все прошло без сучка без задоринки, заранее проверьте инструменты для обрезки. Даже рациональный садовод, который не держит в своем рабочем арсенале ничего лишнего, имеет в своем ящике эти инструменты.

9. Займитесь прививками. Если вы хотите вырастить большой сад, используя при этом минимум финансовых средств, значит, пришло время взяться за окулировочный нож и приступить к прививке "спящим" глазком. Однако не забудьте предварительно прополоть и обработать почву в приствольных кругах.

10. Соберите семена косточковых культур. Хорошая новость для тех, кто хочет получить неприхотливый жизнеспособный саженец, который без ущерба переживет даже самые суровые зимы и при этом покажет стабильно высокую урожайность – это реально. Все это вы сможете получить, если вырастите семенной подвой. Однако прежде чем приступить к процессу выращивания, вам придется заготовить соответствующий посевной материал. Для этого аккуратно извлеките семена вишни, алычи или любой другой косточковой культуры из полностью созревших плодов, затем тщательно их промойте и просушите.

10 САМЫХ ВАЖНЫХ ДЕЛ В ОГОРОДЕ В ИЮЛЕ

1. Соберите урожай. Вы славно потрудились в начале сезона, и вот, наконец, настала пора пожинать первые плоды трудов своих. Пришло время уборки раннеспелых сортов капусты и картофеля. Эти овощи не предназначены для долгого хранения и поэтому лучше всего употреблять их в пищу сразу после уборки.

2. Посейте сидераты. После уборки первого урожая этого года можно будет заняться подготовкой грунта к будущим посадкам. Чтобы грядки, с которых совсем недавно собрали урожай, не "простаивали", посейте на них сидераты. Этим вы не только убережете землю от сорняков и различных заболеваний, но и получите эффективное природное удобрение.

3. Обработайте растения пре-

паратами от вредителей. В середине лета активизируются самые опасные вредители и начинают свой "крестовый поход" болезни. У пасленовых культур (томаты, баклажаны, картофель и перец) – это колорадский жук и фитофтороз. Капуста страдает от налетов крестоцветной блошки, капустной мухи, совки и белянки, заболевает коварной килой. Злостный вредитель огурца – паутинный клещ, а болезнь – антракноз. Лук страдает от луковой мухи и ложной мучнистой росы. Позаботьтесь о своем урожае и своевременно проведите профилактику болезней и вредителей.

4. Пасынкуйте томаты. Процедуру пасынкования проводят только тогда, когда боковые побеги достигнут длины 3-5 см. Обламывая пасынки, оставляйте им небольшие, 2-3-сантиметровые "пеньки". Делается это для того, чтобы на месте удаленной веточки дольше не росла новая.

5. Регулярно поливайте овощи. Дефицит влаги может существенно сократить объем собранного урожая. Особенно важно соблюдать все рекомендации по поливу в летний зной.

6. Не забывайте об удобрениях. С одной стороны, частые поливы оберегают огородные культуры от жарких июльских температур, а с другой – вымывают из почвы большое количество полезных веществ. Особенно сильно от этого страдают томаты. Избежать дефицита питательных веществ помогут подкормки каждые 10-12 дней.

7. Соблюдайте режим проветривания теплиц. Регулярный доступ свежего воздуха в теплицы – гарантия здоровья ваших огородных культур.

Резкие перепады температур, характерные для нашей климатической зоны, негативно сказываются на потенциальном урожае – растения вянут, а процесс фотосинтеза начинает замедляться. Именно поэтому очень важно поддерживать в теплицах комфортную для растений температуру. Обратите внимание, что у каждой культуры к этому параметру – свои требования.


8. Следите за влажностью воздуха в парниках и теплицах. Конденсат, который скапливается на стенках этих построек, приводит к повышению влажности, а значит, способствует распространению большого количества самых разных грибковых заболеваний, характерных для тепличных огурцов, помидоров и прочих овощных культур. В то же время некоторые овощи, например, те же огурцы, очень любят влагу, поэтому и поливают их не так, как других тепличных жителей, а обильно, направляя струю не только на грядки, но и междурядья и даже стены.

9. Подкормите огурцы. Если вы хотите продлить плодоношение огурцов, которые посеяли в мае под пленку, опрыскайте их раствором мочевины (10-15 г на 10 л воды).

10. Проведите санитарный "осмотр" томатов. Внимательно осмотрите растения на предмет пожелтых и больных листьев. Вместе с ними удалите пасынки и цветочные кисти, плоды на которых не успеют сформироваться до конца вегетационного периода.



АВГУСТ

1 • Новолуние
♌ ЛевНе рекомендуются посе-
вы и посадки2 ☾ растущая
луна
♍ ДеваНе рекомендуется сажать
и пересаживать овощи,
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся
декоративные растения,
в частности жимолость,
шиповник. Из цветов ре-
комендуется сажать вью-
щиеся растения.3 ☾ растущая
луна
♍ ДеваНе рекомендуется сажать
и пересаживать овощи,
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся
декоративные растения,
в частности жимолость,
шиповник. Из цветов ре-
комендуется сажать вью-
щиеся растения.4 ☾ растущая
луна
♎ ВесыРекомендуется посадка
цветов, закладка клубней
и семян на хранение. Так-
же рекомендуется посадка
косточковых фруктовых де-
реьев. Эффективны полив
и сенокос. Прекрасная пора
для срезания цветов, соз-
дания газонных орнамен-
тов, ухода за комнатными
растениями5 ☾ растущая
луна
♎ ВесыРекомендуется по-
садка цветов, заклад-
ка клубней и семян на
хранение. Также ре-
комендуется посадка
косточковых фруктовых де-
реьев. Эффективны
полив и сенокос. Пре-
красная пора для сре-
зания цветов, создания
газонных орнаментов,
ухода за комнатными
растениями6 ☾ растущая
луна
♏ СкорпионНе рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы
и сажать деревья. Эф-
фективны прививка,
внесение удобрений,
полив, уничтожение
вредителей, рыхле-
ние почвы7 ☾ растущая
луна
♏ СкорпионНе рекомендуется раз-
множать растения кор-
нями, собирать травы
и сажать деревья. Эф-
фективны прививка,
внесение удобрений,
полив, уничтожение
вредителей, рыхление
почвы8 ☾ растущая
луна
♐ СтрелецРекомендуется посадка
быстрорастущих культур:
зелени, лука, чеснока, пер-
ца, лекарственных трав
— на семена, а также
земляники, шпината, ши-
повника, жимолости, сли-
вы. Рекомендуется сбор
овощей, фруктов, ягод и
семян, срезание цветов.
Посаженные в этот день
домашние цветы быстрее
расцветают9 ☾ Первая
четверть
♐ СтрелецРекомендуется посадка
быстрорастущих культур:
зелени, лука, чеснока,
перца, лекарственных
трав — на семена, а так-
же земляники, шпината,
шиповника, жимолости,
сливы. Рекомендуется
сбор овощей, фруктов,
ягод и семян, срезание
цветов. Посаженные в
этот день домашние цве-
ты быстрее расцветают10 ☾ растущая
луна
♐ СтрелецРекомендуется посадка
быстрорастущих куль-
тур: зелени, лука, чесно-
ка, перца, лекарственных
трав — на семена, а так-
же земляники, шпината,
шиповника, жимолости,
сливы. Рекомендуется
сбор овощей, фруктов,
ягод и семян, срезание
цветов. Посаженные в
этот день домашние цве-
ты быстрее расцветают11 ☾ растущая
луна
♑ КозерогРекомендуется посадка
и пересадка деревьев и
кустарников, особенно
грушевых и сливовых
деревьев, крыжовника,
смородины. Рыхление,
внесение удобрений,
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цве-
тов составляют пре-
красные букеты12 ☾ первая
четверть
♑ КозерогРекомендуется посадка
и пересадка деревьев
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых
деревьев, крыжовника,
смородины. Рыхление,
внесение удобрений,
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цве-
тов составляют прекрас-
ные букеты13 ☾ растущая
луна
♒ ВодолейРекомендуется посадка
и пересадка деревьев
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых
деревьев, крыжовника,
смородины. Рыхление,
внесение удобрений,
прививка деревьев, по-
кос. Из срезанных цве-
тов составляют прекрас-
ные букеты14 ☾ растущая
луна
♒ ВодолейРекомендуется посадка
и пересадка деревьев
и кустарников, особен-
но грушевых и сливовых де-
реьев, крыжовника, смо-
родины. Рыхление, внесе-
ние удобрений, прививка
деревьев, покос. Из сре-
занных цветов составля-
ют прекрасные букеты15 • полнолуние
♓ ВодолейНе рекомендуются посе-
вы и посадкиЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АВГУСТ 2019 ГОДА
С УКАЗАНИЕМ НОВОЛУНИЯ, ПОЛНОЛУНИЯ, ФАЗ ЛУНЫ, ПОЛОЖЕНИЕМ ЛУНЫ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА,
А ТАКЖЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ16 ☾ убывающая
луна
♊ РыбыРекомендуется заготовли-
вать семена, срезать цве-
ты в букеты. Заготовка ва-
рений и солений. Отличное
время для культивации и
внесения удобрений17 ☾ убывающая
луна
♊ РыбыРекомендуется заготов-
ливать семена, срезать
цветы в букеты. Заго-
товка варений и соле-
ний. Отличное время
для культивации и вне-
сения удобрений18 ☾ убывающая
луна
♋ ОвенРекомендуется заготовли-
вать семена, срезать цветы
в букеты. Заготовка варений
и солений. Отличное время
для культивации и внесения
удобрений19 ☾ убывающая
луна
♋ ОвенНе рекомендуются по-
севы и пересадки. Реко-
мендуется уничтожение
вредителей, прополка и
мульчирование. Сбор уро-
жая корнеплодов, фрук-
тов, ягод, лекарственных и
эфиромасличных культур,
сушка овощей и фруктов20 ☾ убывающая
луна
♌ ОвенНе рекомендуются по-
севы и пересадки. Реко-
мендуется уничтожение
вредителей, прополка и
мульчирование. Сбор уро-
жая корнеплодов, фрук-
тов, ягод, лекарственных и
эфиромасличных культур,
сушка овощей и фруктов21 ☾ убывающая
луна
♍ ТелецРекомендуется посадка
озимого чеснока, лука.
Подстригание деревьев
и кустарников. Фрукты,
ягоды и овощи, снятые в
это время, а также гри-
бы пригодны для созда-
ния зимних запасов22 ☾ убывающая
луна
♍ ТелецРекомендуется посадка
озимого чеснока, лука.
Подстригание деревьев
и кустарников. Фрукты,
ягоды и овощи, снятые в
это время, а также грибы
пригодны для создания
зимних запасов23 ☾ убывающая
луна
♎ БлизнецыНе рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффектив-
ны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка,
культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарствен-
ных трав, корнеплодов,
фруктов и ягод24 ☾ убывающая
луна
♎ БлизнецыНе рекомендуется посад-
ка и пересадка травяни-
стых культур. Эффективны
удаление лишних побегов,
покос, прополка, культив-
ация, мульчирование. Сбор
лекарственных трав, кор-
неплодов, фруктов и ягод25 ☾ последняя
четверть
♎ БлизнецыНе рекомендуется по-
садка и пересадка
травянистых культур.
Эффективны удаление
лишних побегов, покос,
прополка, культивация,
мульчирование. Сбор
лекарственных трав,
корнеплодов, фруктов
и ягод26 ☾ убывающая
луна
♏ РакРекомендуется заготовка
зелени и лекарственных
трав, которые требуют
особо эффективной суш-
ки. В эти дни собирают
все, что не подлежит дли-
тельному хранению. Уда-
ются в это время консер-
вы и соленья27 ☾ убывающая
луна
♏ РакРекомендуется заго-
товка зелени и лекар-
ственных трав, которые
требуют особо эффек-
тивной сушки. В эти дни
собирают все, что не
подлежит длительному
хранению. Удаются в
это время консервы и
соленья28 ☾ убывающая
луна
♏ ЛевНе рекомендуется посе-
в и пересадка садово-о-
городных культур. Реко-
мендуется сбор и сушка
фруктов и корнеплодов.
Готовим грядки к посад-
кам, мульчирования, для
обрезки деревьев, для
сбора семян подсолнеч-
ника, заготовки лекар-
ственных трав29 ☾ убывающая
луна
♏ ЛевНе рекомендуется посе-
в и пересадка садово-о-
городных культур. Реко-
мендуется сбор и сушка
фруктов и корне-
плодов. Готовим гряд-
ки к посадкам, мульчи-
рования, для обрезки
деревьев, для сбора
семян подсолнечника,
заготовки лекарствен-
ных трав30 ☾ убывающая
луна
♐ ДеваНе рекомендуются посе-
вы и посадки31 ☾ убывающая
луна
♐ ДеваНе рекомендуется сажать
и пересаживать овощи,
фруктовые деревья, про-
изводить посадки на се-
мена. Хорошо приживутся
декоративные растения,
не предназначенные для
плодоношения, в частно-
сти жимолость, шиповник.
Из цветов рекоменду-
ется сажать вьющиеся
растения.

Спрашивайте в магазинах города и области.

Представительство в Волгограде: ул. Историческая, 181, стр.1 «МУЗЕЙ СЕМЯН»
(на территории Народной ярмарки), тел.: 8 (8442) 97-95-05



Удобрение МЕРА DeLuxe – эффективное универсальное средство для подкормки цветов в течение всего года (весна/лето/осень/зима). Способствует хорошему росту комнатных и садовых цветов, содержит в себе 15 необходимых и полезных микро- макроэлементов. У декоративных цветочных культур повышается сортность, увеличивается кустистость, побеги, листья и цветки окрашиваются в более насыщенный цвет, возрастает приживаемость саженцев.

Удобрение МЕРА ОКЕАН РОЗ – активизирует полезную почвенную микрофлору в течение года. Стимулирует процессы метаболизма бутонов роз. Удобрение помогает розам быстро восполнить недостающие им элементы питания, очень хорошо действует на молодые розы. Улучшает декоративные свойства растений, надежно защищает корни от пересыхания и переувлажнения.



УДОБРЕНИЯ МЕРА - №1 ДЛЯ ЯРКОЙ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ!

Состав удобрений МЕРА индивидуален! МЕРА – гуминовые органоминеральные удобрения на основе настоящего лигногумата с необходимой массовой долей микроэлементов в хелатной форме.



Удобрение МЕРА СПЕЛЁНЫШ повышает энергетический обмен в клетках от семян до завязи. Стартовый источник микроэлементов для рассады. Подкормки удобрением помогают рассаде противостоять болезням, которые могут поджидать сеянцы в почве при нарушении условий выращивания и ухода. Крепкая «сытая» рассада стойко выдерживает нападки болезнетворных патогенов.

Удобрение МЕРА КЛУБНИЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ – увеличивает накопление сахаров и витаминов в ягодах, +34% проницаемости клеточных мембран. На клубничных/земляничных плантациях применение удобрения способствует более раннему созреванию ягод, а также продлению обильного плодоношения.



+7 (988) 005-75-35 (опт)
www.mera1.ru



* 1 пакет на 4 ведра.
Рекомендованная розничная цена 24 р.00 к.

На правах рекламы

Дачная
АГРОМЕРА

БЕСЦЕННЫЕ СОВЕТЫ НА САЙТЕ agromera-da.ru

Дата выхода в свет: 10.07.2019 г.

Распространение на территории
Волгоградской области
Тираж: 20 000 экземпляров



Газета "Дачная АгроМЕРА" № 7 (46) июль 2019

Учредитель: ООО "МЕРА"

Главный редактор: Барахтенко В. В.

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по
Волгоградской области и Республике Калмыкия
ПИ № ТУ34-00850 от 10.05.2018

Цена свободная

Газета отпечатана: Типография Prinithit
г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова 156/1

Адрес издателя/редакции: 400075 Волгоград, ул. Историческая 181, стр. 1

Адрес для корреспонденции: 400131 Волгоград, ул. Краснознаменская 7, кв. 132

Телефон для региональной и федеральной рекламы: +79047797583

e-mail: agromera34@mail.ru

Сайт: agromera-da.ru

Рекламный отдел: Хамдинова О.В.

Верстка: Маврина А.В.

Внимание! Помимо рекламных модулей в газете можно опубликовать сопроводительную (подготовительную) публикацию размером 1 полоса к рекламе на 1 полосу предоставляется по цене 30% от стоимости рекламы за одну полосу (чтобы рядом не стояла реклама конкурента и Ваша статья могла подготовить читателя к рекламе)